

SOSPENSIONE TEMPORANEA (fino a risoluzione)

- Colite, Diarrea, Vomito e Gastrite
- Periodo di **Flusso Mestruale**
- **Ipertensione**: valutata da caso a caso
- **Psoriasi** in fase acuta presente sulla sede del prelievo
- **Gengivostomatite**
- **Raffreddore** con o senza utilizzo di farmaci

SOSPENSIONE PER FARMACI (dall'ultima assunzione)

Antibiotici orali	15 giorni
Antibiotici parenterali	30 giorni
Antidepressivi	30 giorni
Antinfiammatori FANS	5-7 giorni
Antistaminici	10 giorni
Cortisonici	15 giorni
Inibitori pompa protonica (es: omeprazolo)	5 giorni
Ansiolitici- Ipnoinduttori	3-7 giorni
Eparina	90 giorni
Finasteride	60 giorni
Dutasteride	180 giorni
Farmaci per la cura dell'ipertrofia prostatica benigna	2 mesi
Farmaci per la cura della psoriasi	1 anno
Statine	5 giorni

VACCINAZIONI	
Antirabbica: se il soggetto non è stato morso	2 giorni
Antirabbica: se il vaccino è stato somministrato dopo esposizione	1 anno
Antiepatite B	7 giorni
Difterite, Pertosse, Tifo e Paratifo per bocca, Colera, Peste, Influenza, Antimeningococco, Antipneumococco, Antiepatite A, Antitetano	2 giorni
BCG, Antivaiolo (orale), Antimorbillo, Atiparotite, Antirosolia, Antifebbre gialla	1 mese

ALLERGIA	
A Farmaci	2 mesi dall'episodio
Stagionale	Per tutto il periodo sintomatico
Vaccini desensibilizzanti	3 giorni dall'ultima dose

INFEZIONI E PATOLOGIE	
Febbre >38°	15 giorni dopo la cessazione dei sintomi
Febbre Q, TBC in assenza di danno d'organo, Brucellosi, Osteomielite	2 anni
Citalomegavirus	6 mesi dalla guarigione
Contatti con malattie esantematiche	1 mese
Epatite A	4 mesi dalla guarigione
Malattie esantematiche	15 giorni dalla guarigione
Glaucoma	Nessuna sospensione
Glomeronefrite acuta	4 anni dalla guarigione
Herpes simplex	1 settimana dalla guarigione

Immunoglobuline	4 mesi
Herpes zoster	2 settimane dalla guarigione
Influenza	2 settimane dalla guarigione
Congiuntivite	7 giorni
Malattia di Lyme	6 mesi dalla guarigione
Mononucleosi	6 mesi dalla guarigione
Puntura di zecca	3 mesi
Tifo o salmonellosi	1 anno
Toxoplasmosi	6 mesi dalla guarigione
Tubercolosi	2 anni dalla guarigione

INTERVENTI CHIRURGICI E ODONTOIATRICI

Aborto	6 mesi dall'evento
Ablazione tartaro, otturazioni	2 giorni
Estrazione, implantologia dentaria	1 settimana dalla guarigione della ferita
Endoscopia	4 mesi
Donazione del Midollo Osseo	1 anno
Gastroresenzione parziale per ulcera peptica	Sospensione Sangue Intero Idoneo per Plasma
Interventi con anestesia generale o spinale	4 mesi
Taglio cesareo	1 anno
Interventi in anestesia locale	1 mese (previa visione esame istologico)
Interventi oculistici con laser	2 mesi
Trapianto di cellule e tessuti	4 mesi
Trasfusioni, Infusione emoderivati, Donatori con partner trasfuso	4 mesi

ALTRE SOSPENSIONI

Agopuntura	Nessuna se effettuata con aghi monouso; Altrimenti 4 mesi
Alterazioni elettrocardiografiche	Da valutare con il cardiologo AVIS
Convivenza con portatore di epatite	Epatite B: fino a sviluppo anticorpi Epatite C: definitiva se partner sessuale
DIA corretto chirurgicamente, PFO	Da valutare con consulenza cardiologica AVIS
Droghe leggere: hashish, marijuana	6 mesi dallo stop dell'assunzione
Foro orecchino	4 mesi (idoneità solo se usati strumenti a perdere)
Malaria	Sospensione definitiva per sangue intero, idoneità per plasmaferesi 6 mesi dopo la guarigione
Malattie psichiatriche: • depressione • psicosi	Fino a guarigione definitiva
Parto	1 anno
Piercing	4 mesi (idonei solo se usati strumenti a perdere)
Tatuaggi/trucco permanente	4 mesi

COMPORTAMENTI SESSUALI

Cambio partner	4 mesi da inizio relazione sessuale
Partner occasionale, Partner affetto o a rischio di: HIV ,HBV, HCV	4 mesi dall' ultimo rapporto a rischio

VIAGGI IN EUROPA E NEL MONDO

Consultare la propria Sede Avis

SOSPENSIONE DEFINITIVA

Alcolismo, Tossicodipendenza
Asbestosi, Silicosi
Asma cronica (in trattamento), BPCO
Malattie autoimmuni
Trapianto d' organo e xenotrapianto
Babebiosi
Cardiopatia ischemica, Difetti cardiaci, Infarto miocardico acuto -Angina pectoris
Soggiorno nel Regno Unito per almeno 6 mesi continuativi dal 1980 al 1996
Diabete
Tripanosomiasi
Disendocrinie
Embolia polmonare
Epatite B, C, ed epatite da eziologia indeterminata
Epilessia
Filariosi
Glomerulonefrite cronica
Ischemia-TIA
Lebbra
Leishmaniosi
Malattie autoimmuni, ematologiche, intestinali croniche, neurodegenerative
Neoplasie Maligne
Rene policistico
Sarcoidosi
Sifilide

Le informazioni sono a titolo indicativo. Per eventuali dubbi o altri motivi sanitari contattare la propria Sede Avis o i Medici del centro trasfusionale presso il quale si dona.

